



Sob todas as formas do produto deve ser usado novamente sete dias após o primeiro uso, repetindo o esquema de tratamento, devido a possível reinfestação por permanência de ovos.

CONDUTA NA SUPERDOSAGEM

No caso de ingestão acidental, o tratamento é principalmente de suporte. Deve-se induzir vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica nos inconscientes. Pode-se administrar sais catárticos para aumentar o trânsito intestinal e diminuir a absorção intestinal da piretrina. No caso de inalação acidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

Pacientes idosos

Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos. Devendo levar em consideração o estado geral do paciente.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

© Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0577.0133

Nº do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Anibal dos Anjos Carvalho, 212

Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



Deotrin®

deltametrina



FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Loção: embalagem contendo um frasco com 100 mL.

Shampoo: embalagem contendo um frasco com 100 mL.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL de loção contém:

deltametrina	0,2 mg
excipiente q.s.p.	1 mL
(nonilfenol etoxilado, lauriletersulfato de sódio, metilparabeno, álcool etílico, propilenoglicol e essência de alfazema)	

Cada mL de shampoo contém:

deltametrina	0,2 mg
excipiente q.s.p.	1 mL
(nonilfenol etoxilado, lauriletersulfato de sódio, cocoamidopropilbetaina, dietanolamina cocamida, glicerol, ácido cítrico, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, corante amarelo crepúsculo, essência de alfazema, hietelose e água)	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

A deltametrina é um derivado piretroide com atividade escabicida e pediculicida.

Cuidados de Armazenamento

O produto deverá ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e protegido da luz.

Prazo de validade

24 meses a contar da data de sua fabricação, não devendo ser utilizado se o prazo de validade estiver vencido.

Gravidez e lactação

Não se conhecem riscos de uso do DEOTRIN® durante a (ou na suspeita de) gravidez e durante o aleitamento materno. Contudo, informe seu médico se estiver grávida ou amamentando durante o tratamento.

Cuidados de administração

É importante informar ao médico caso apresente qualquer tipo de doença, principalmente asma, alergias ou lesões da pele (feridas ou queimaduras).

Não usar DEOTRIN® para tratamento das sobrancelhas ou cílios. DEOTRIN® pode causar irritação ocular e da pele. No caso de contato com os olhos, lavá-los por cerca de 15 minutos em água corrente e procurar orientação médica.

BK03024





Evitar a contaminação de alimentos pelo produto. Não reutilizar o recipiente vazio.

O período de tratamento estabelecido pelo médico deverá ser rigorosamente obedecido, não devendo ser excedido ou repetido sem recomendação médica.

Como normas gerais de higiene, recomenda-se:

- Ferver a roupa de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas;
- Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (pioelhos) e fitiríase (chatos) manter os cabelos curtos e limpos;
- Procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles ou seus objetos de uso;
- Alertar os responsáveis por instituições coletivas frequentadas pelo portador do parasita, principalmente escolas e creches.

Reações adversas

Informar ao médico caso ocorra qualquer outro efeito colateral.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contraindicações e Precauções

Deve-se tomar cuidado ao aplicar DEOTRIN® próximo às cavidades naturais (olhos, boca, nariz, orelhas, genitais e ânus) para que não haja risco de absorção inadvertida pelas mucosas ou irritação local. Para se evitar o risco de inalação da substância, aplicar DEOTRIN® em ambiente ventilado e manter em contato o período previsto.

Devido à fácil transmissão da parasitose aos contactantes (familiares, parceiros sexuais), aconselha-se a pesquisa e tratamento dos outros afetados pelo mesmo agente.

Interrupção do tratamento

Não há cuidados a serem tomados para a interrupção do tratamento com DEOTRIN®. Entretanto, não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características químicas e farmacológicas

A deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretroides, substância sintética obtida por esterificação do ácido crisântêmico, extraído da flor do crisântemo (*Chrysanthemum cinerariaefolium*).

A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra pioelhos e ácaros.

A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas sendo o *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus humanus*, *Phthirus pubis* e seus ovos extraordinariamente sensíveis a sua ação.

A sua ação é seletiva e se dá após a absorção da substância através do exoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto a

deltametrina transporta pela hemolinfa, fixa-se nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do sistema nervoso central, produzindo excitabilidade, falta de coordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

INDICAÇÕES

DEOTRIN® está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (pioelhos), da fitiríase (chatos) da escabiose(sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a deltametrina.

Alergia respiratória.

Lesões de pele: feridas e queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção.

PRECAUÇÕES

DEOTRIN® está indicado somente para uso tópico. Não deve ser ingerido ou inalado.

Deve ser mantido fora do alcance dos olhos e mucosa.

No caso de contato acidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por cerca de 15 minutos.

No caso de infecção ou irritação da pele, interromper o tratamento.

Gravidez e lactação

Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso de DEOTRIN® na gravidez ou lactação. Contudo deve-se considerar o risco/benefício antes da indicação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há relatos de interações.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer irritação cutânea, ocular, e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo alergia respiratória.

No caso do uso em pele lesada por feridas ou queimaduras, pode ocorrer maior absorção da deltametrina com efeitos gastrintestinais e neurológicos agudos.

MODO DE USAR - EXTERNO

Antes do tratamento, fazer a limpeza e fervura das roupas e objetos de uso pessoal (principalmente pentes e escovas para o cabelo) do paciente e contactantes, para evitar a reinfestação após a aplicação.

DEOTRIN® Loção

Fricionar toda a região afetada ou todo o corpo caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho. Usar por quatro dias consecutivos.

DEOTRIN® Shampoo

Deve ser aplicado nas áreas atingidas, de preferência durante o banho, fazendo-se ligeiras fricções com as pontas dos dedos.

Deixar as áreas atingidas e ensaboadas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante quatro dias consecutivos.

