



Neocetrin[®]

sulfato de neomicina
bacitracina zínica



FORMA FARMACÉUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Pomada dermatológica: embalagem contendo uma bisnaga com 15 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada dermatológica contém:

sulfato de neomicina (equivalente a 3,5 mg de neomicina)	5 mg
bacitracina zínica	250 UI
excipiente q.s.p.	1 g

(álcool etílico, metilparabeno, vaselina líquida, petrolato amarelo e polietileno).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- A ação esperada de sulfato de neomicina com bacitracina é a de anti-infeccioso tópico de uso externo.
 - NEOCETRIN[®] deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).
 - **Prazo de validade:** 36 meses a contar da data de sua fabricação. **ATENÇÃO:** Não utilize os produtos após vencido o prazo de validade, sob o risco de não produzir os efeitos desejados.
 - Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.
 - Informe ao médico se está amamentando.
 - Não aplicar sobre os olhos. Antes de aplicar o produto, lavar a região afetada com água e sabão e secar cuidadosamente o local; depois da aplicação, pode-se cobrir a zona tratada com gaze.
 - Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
 - Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
 - Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como prurido, vermelhidão, inchaço ou qualquer irritação local não existente antes do uso do produto, ou caso ocorra qualquer diminuição da audição.
- TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**
- Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.
- NÃO TOME REMÉDIO SEM CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

O sulfato de neomicina é um antibiótico aminoglicosídeo, bactericida, ativo contra numerosas bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Atravessa a membrana celular bacteriana mediante transporte ativo e interfere na síntese proteica do micro-organismo.

A bacitracina, antibiótico polipeptídico, possui ação bactericida frente a micro-organismos Gram-positivos e alguns cocos Gram-negativos. Age interferindo na síntese da parede celular bacteriana. Apesar de não ser absorvida através da pele intacta, a neomicina aplicada topicamente é facilmente absorvida através de grandes regiões expostas, queimadas, ou com tecido de granulação. A bacitracina, por sua vez, não apresenta absorção significativa após aplicação tópica sobre a pele intacta ou lesionada, ou sobre membranas mucosas. Não





ocorrendo absorção, a ação do medicamento é limitada ao local de aplicação. A associação de ambos em seu uso tópico, se justifica como prevenção de desenvolvimento de micro-organismos resistentes à neomicina e bacitracina, pela somação de efeitos.

INDICAÇÕES

No tratamento de infecções bacterianas da pele e mucosas, causadas por micro-organismos sensíveis à ação da neomicina e bacitracina, tais como: piodermites, impetigo, eczemas infectados, furúnculos, antraz, éctima, abscessos, acne infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas decorrentes de cortes (inclusive de origem cirúrgica), abrasões, queimaduras pouco extensas, ferimentos, produzidos por micro-organismos sensíveis. Infecções nasais e do ouvido externo, causadas por micro-organismos sensíveis.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componente da associação.

PRECAUÇÕES

Podem ocorrer sensibilidade cruzada se o paciente utilizar outros produtos contendo antibióticos aminoglicosídeos. Quando o produto é aplicado em grandes áreas da pele, com lesão, pode ocorrer absorção sistêmica significativa, com risco de nefrotoxicidade ou ototoxicidade, especialmente se a função renal estiver prejudicada, ou na administração concomitante de fármacos sistêmicos nefrotóxicos e ototóxicos. Não empregar para uso oftálmico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não se recomenda o uso simultâneo desta associação com fármacos relacionados, por exemplo, outros aminoglicosídeos, por via sistêmica, já que reações de hipersensibilidade podem ocorrer com maior frequência.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer prurido, rash cutâneo, vermelhidão, inchaço ou outros sinais de irritação local.

POSOLOGIA

Aplicar sobre a região afetada 2 a 5 vezes ao dia, utilizando-se ou não curativos semi-oclusivos. Em queimaduras e cavidades pós-cirúrgicas pode-se utilizar faixas de gaze untadas com o produto.

SUPERDOSAGEM

O quadro clínico por ingestão acidental ou superdosagem ainda não é conhecido. Na eventualidade, adotar as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO
COM RETENÇÃO DA RECEITA**

Reg. MS nº 1.0577.0149

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212

Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



 **BUNKER**

BK03030

